



更多品种在研中...

补佳泰®
氯化钾缓释片

加衡®
左甲状腺素钠片

将唐君®美迪康
盐酸二甲双胍片

日理达®
氨麻美敏胶囊(II)

将唐君®
盐酸二甲双胍肠溶胶囊

联系我们

电话: 0755-25726794
25739667

地址: 深圳市坪山区坑梓
街道金沙社区丹青路9号

药物警戒电话及邮箱:
0755-25700016
ywjj@zlzy.com

通用名称: 氯化钾缓释片

商 标: 补佳泰®
批准文号: 国药准字H20033371
生产厂家: 深圳市中联制药有限公司
医 保: 国家甲类医保
国家基药: 是
产品规格: 0.5g, 12片/板;
24片/盒, 300盒/箱;
48片/盒, 200盒/箱。

产品特点:

- 国采中标品种, 质量有保障;
- 采用先进热熔挤出工艺, 骨架缓释片剂;
- 缓释片缓慢释放药物, 胃肠道刺激更小;
- 预防、治疗低钾血症。



口服补钾是最安全的补钾方法, 能口服不注射


适用范围: 用于治疗 and 预防伴或不伴代谢性碱中毒的低钾血症, 在这些患者通过富含钾的食物进行膳食管理或减少利尿剂剂量治疗效果不佳时。

通用名称: 盐酸二甲双胍片

商 标: 将唐君®美迪康
生产厂家: 深圳市中联制药有限公司
医 保: 国家甲类医保
国家基药: 是
批准文号及产品规格:
(1) 国药准字H44024853: 0.25g, 12片/板;
24片/盒, 400盒/箱;
48片/盒, 300盒/箱;
96片/盒, 120盒/箱。
(2) 国药准字H20023251: 0.5g, 10片/板;
40片/盒, 200盒/箱。

产品特点:

- 苏陕联盟集采续标中标, 93年上市, 国内首仿, 品牌和质量双重保障;
- 累计销售百亿片, 优质性价比, 保障供应;
- 餐后或餐中服用, 胃肠道刺激小, 减少肝糖的产生, 降低肠道对葡萄糖的吸收, 通过外周糖的摄取和利用而提高胰岛素的敏感性。



2型糖尿病药物治疗的首选是二甲双胍

适用范围: 本品首选用于单纯饮食及体育锻炼控制血糖无效的2型糖尿病。对于成人, 本品可用于单药治疗, 也可以与磺脲类药物或胰岛素联合治疗。对于10岁及以上的儿童和青少年, 本品可用于单药治疗或与胰岛素联合治疗。

通用名称: 左甲状腺素钠片

商 品 名: 加衡®
生产厂家: 深圳市中联制药有限公司
医 保: 国家甲类医保
国家基药: 50μg
批准文号及产品规格:
(1) 国药准字H20010008: 25μg, 20片/板, 60片/盒;
(2) 国药准字H20010522: 50μg, 25片/板, 100片/盒;
(3) 国药准字H20000286: 100μg, 20片/板, 60片/盒;
以上规格均为200盒/件。

产品特点:

- 唯一国产, 原制一体;
- 甲状腺功能减退替代治疗、甲状腺癌抑制治疗ATA推荐首选用药;
- 规格齐全 (25μg、50μg、100μg) 满足临床需要;
- 制剂稳定, 疗效与进口同类品无明显差异。



国内独家生产, 原制一体
国内唯一25ug

适用范围: 适用于先天性甲状腺功能减退症(克汀病)与儿童及成人的各种原因引起的甲状腺功能减退症的长期替代治疗, 也可用于单纯性甲状腺肿, 慢性淋巴细胞性甲状腺炎, 甲状腺癌手术后的抑制(及替代)治疗。也可用于诊断甲状腺功能亢进的抑制试验。

通用名称: 氨麻美敏胶囊(II)

商 品 名: 日理达®
批准文号: 国药准字H20010727
生产厂家: 深圳市中联制药有限公司
产品规格: 对乙酰氨基酚325毫克, 盐酸伪麻黄碱30毫克, 氢溴酸右美沙芬10毫克, 马来酸氯苯那敏2毫克;
10粒/盒, 300盒/箱;
14粒/盒, 300盒/箱。

产品特点:

- 复方感冒药制剂;
- 具有解热镇痛、镇咳祛痰、减轻鼻粘膜充血及抗过敏等多重作用。



西药复方, 感冒良药
治感冒, 看疗效

适用范围: 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、咽痛等症状。

通用名称: 盐酸二甲双胍肠溶胶囊

商 标: 将唐君®
批准文号: 国药准字H20094132
生产厂家: 深圳市中联制药有限公司
医 保: 国家甲类医保
国家基药: 是
产品规格: 0.25g, 12片/板;
48粒/盒, 200盒/箱。

产品特点:

- 2型糖尿病调糖的基石用药, 有效延缓并发症;
- 肠溶胶囊较肠溶片在靶向给药时间窗内溶出更快、更完全、吸收更好;
- 餐前服用方便, 依从性好, 生物利用度与同类上市品等效。



2型糖尿病调糖的基石用药, 有效延缓并发症

适用范围: (1) 本品首选用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病, 特别是肥胖的2型糖尿病。(2) 对于1型或2型糖尿病, 本品与胰岛素合用, 可增加胰岛素的降血糖作用, 减少胰岛素用量, 防止低血糖发生。(3) 本品也可与磺脲类等口服降血糖药合用, 具协同作用。